

¿Cómo reduzco el riesgo de contraer gonorrea?

La forma más eficiente y segura de evitar el contagio es usar el preservativo de manera adecuada en cada acto sexual, y en lo posible, con una pareja estable.

Someterse a un examen anualmente y pedirle a su pareja que también lo haga.

Recuerde que:

CUALQUIER PERSONA SEXUALMENTE ACTIVA PUEDE CONTRAER ESTA ENFERMEDAD!



CÁTEDRA DE MICROBIOLOGÍA 2013



A E R R O Z O G

¿Qué Síntomas puedo tener?

Si Ud. es mujer puede que no presente síntomas o algunos síntomas muy leves , como por ejemplo:

- Dolor o ardor al orinar.
- Aumento del flujo vaginal.
- Sangrado vaginal entre períodos.
- Picazón anal.
- Dolor al defecar.

Si Ud. es hombre puede presentar alguno de los siguientes síntomas:

- Secreción blanca, verdosa, o amarillenta del pene .
- Dolor o inflamación de los testículos.

¿Qué es la GONORREA?

Es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por una bacteria. Puede afectar a áreas húmedas y tibias del aparato reproductivo. La bacteria también puede crecer, en la garganta, la boca, los ojos y el ano.



¿Cómo se puede contraer?

Esta enfermedad se adquiere mediante los fluidos corporales, por relaciones sexuales tanto anales, vaginales y orales con alguien que la padezca. También puede transmitirse de la madre al bebé durante el parto.

Para detectarla, debe concurrir a su médico que le tomara una muestra de la mucosa y las secreciones corporales.

¿Qué debo hacer si tengo Gonorrea?

Se puede tratar mediante el uso de antibióticos recetados por su médico. Si los síntomas continúan, debe concurrir a una nueva consulta. No olvidar, que por más de que haya sido tratada, puede volver a contraerse.

Debe tratarse a tiempo si no puede llevar consigo muchas complicaciones como dificultad para quedar embarazada y esterilidad en el hombre, también ocasionar una enfermedad infecciosa grave en el útero de la mujer, entre otras.

